

БАВЕНСИО® (авелумаб)

БАВЕНСИО® с акситинибом: новая высокоэффективная комбинация иммуноонкологического препарата и ингибитора тирозинкиназы в первой линии терапии распространенного ПКР.

Комбинация обладает комплементарным механизмом действия: ингибирование PD-L1 и ангиогенеза

СТАВЬТЕ СИЛЬНУЮ ПАРУ ВПЕРЕД!



БАВЕНСИО (авелумаб):

1. Устраняет супрессивное воздействие PD-L1 на цитотоксический потенциал Т-клеток
2. Прямой лизис опухолевых клеток посредством авелумаб-индуцированной антителозависимой клеточной цитотоксичности (АЗКЦ)

Показания к применению:

- В комбинации с акситинибом в качестве терапии первой линии при распространенном почечно-клеточном раке у взрослых
- Монотерапия у взрослых ранее леченных пациентов с метастатической карциномой Меркеля (МКМ).

ПКР – метастатический почечно-клеточный рак;
PD-L1 – лиганд программируемой клеточной гибели 1

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Бавенсио® от 23.11.2020г. от 09.06.2020 (регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения ЛП-005886 от 20.10.2019)



ООО «Пфайзер Инновации»
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10,
БЦ «Башня на Набережной» (блок С).
Тел.: +7 (495) 287-50-00. Факс: +7 (495) 287-53-00.

PP-BAV-RUS-0011
26.01.2021

ИНЛИТА® (акситиниб) – препарат для таргетной терапии метастатического почечно-клеточного рака (мПКР).



• **Селективный и мощный ингибитор тирозинкиназы рецепторов фактора роста эндотелия сосудов VEGFR-1, VEGFR-2 и VEGFR-3.** Эти рецепторы участвуют в патологическом опухолевом росте, метастазировании опухолей и онкологическом ангиогенезе. После связывания препарата с этими рецепторами блокируется важный путь, называемый VEGF-опосредованной пролиферацией, способствующий росту кровеносных сосудов внутри опухоли, таким образом тормозится ее развитие и метастатический процесс¹

• **ИНЛИТА® рекомендована для терапии мПКР первой линии в комбинации с ИО препаратами, такими как БАВЕНСИО®(авелумаб)² и пембролизумаб³**

Показания к применению:

• **Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)¹**

ПКР – метастатический почечно-клеточный рак

КИ – клинические исследования

ИО – иммуноонкологические препараты

1. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Инлита® (Регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения ЛП-002115 от 01.07.2013 г.)

2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Бавенцио® от 23.11.2020г. от 09.06.2020 (регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения ЛП-005886 от 20.10.2019)

3. Клинические рекомендации: Рак паренхимы почки. 2020 (Ассоциация Онкологов России)



ООО «Пфайзер Инновации»

Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10,
БЦ «Башня на Набережной» (блок С).

Тел.: +7 (495) 287-50-00. Факс: +7 (495) 287-53-00.

PP-INL-RUS-0048

26.01.2021